

**END
POLIO
NOW**

Rotary
LE MANS



PASSER À L'ACTION
ÉRADIQUER UNE MALADIE POUR TOUJOURS

Rotary





5 RAISONS D'ÉRADIQUER LA POLIO

1 VOTRE DON VA CHANGER DES VIES.

Aujourd'hui, 19 millions de personnes qui auraient sans cela été paralysées peuvent marcher et 1,5 million qui seraient autrement mortes sont en vie.

2 VOTRE DON EST UN INVESTISSEMENT DANS L'AVENIR.

Si nos efforts d'éradication s'arrêtaient aujourd'hui, la polio pourrait rebondir et paralyser 200 000 enfants par an d'ici 10 ans. Un monde sans polio est plus sûr pour tous les enfants.

3 VOTRE DON VA AMÉLIORER LA SANTÉ DES ENFANTS.

Les réseaux de surveillance de la polio et les campagnes de vaccination permettent de suivre les enfants pour d'autres problèmes de santé, comme les carences en vitamines et la rougeole, qui peuvent être traitées plus tôt.

4 VOTRE DON PERMET DE RÉDUIRE LES COÛTS DE SANTÉ.

L'effort mondial d'éradication de la polio a déjà permis d'économiser plus de 27 milliards de dollars US en frais de santé depuis 1988, et il doit permettre d'économiser 14 milliards de plus d'ici 2050.

5 VOTRE DON VA ÉCRIRE UNE PAGE D'HISTOIRE.

L'éradication de la polio sera l'un des plus grands accomplissements de l'histoire en matière de santé publique, devenant la deuxième maladie humaine après la variole à être éradiquée.



À la fin des années 80, plus de 350 000 enfants étaient paralysés tous les ans par la polio. Aujourd'hui, le Rotary et ses partenaires ont réduit le nombre de cas de polio de 99,9 pour cent. Jusqu'à ce que le poliovirus disparaisse, les efforts d'éradication ont cependant toujours besoin de financements supplémentaires pour :

VACCINER

plus de 400 millions
d'enfants contre la polio
tous les ans

AMÉLIORER

les systèmes de surveillance
de la maladie pour détecter le
poliovirus dans une personne ou
l'environnement

EMBAUCHER

plus de 150 000 professionnels de santé
pour faire du porte-à-porte
afin de n'oublier aucun enfant

Faire un don sur
endpolio.org/fr

Tuberculose (BCG)

La vaccination contre la tuberculose est le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP)

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

Coqueluche

Le rappel de l'adulte contre la coqueluche se fait à 25 ans avec rattrapage possible jusqu'à 39 ans. La vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte dès le 2^e trimestre de grossesse est recommandée pour protéger son nourrisson.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1^{re} année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

Pneumocoque

Cette vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons et est recommandée aux personnes de 65 ans et plus.

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

Méningocoques ACWY

La vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons depuis le 1^{er} janvier 2025 avec une dose à 6 mois suivie d'un rappel à 12 mois. Elle est également recommandée chez les adolescents entre 11 et 14 ans.

Méningocoque B

Depuis janvier 2025, cette vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons à 3, 5 et 12 mois.

Rotavirus

Recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois. Deux à trois doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les per-

sonnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg m²). La vaccination contre la grippe peut aussi être proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

Covid-19

En automne, en plus des personnes à risque ciblée par la grippe, cette vaccination est aussi recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21.

Au printemps, la vaccination est recommandée pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d'EHPAD et USLD, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes de 65 ans et plus.

VRS

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus. Elle est également recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

Pour en savoir plus



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

